

Dekorativa vivlar



Nanophyes marmoratus



Tachyerges salicis

Långt ifrån alla vivlar är oansenliga och enfärgade, en del av dem är vaxkert mönstrade. Det kan dock vara svårt att se mönstret i fält, de här två arterna är små, bara 2- 2,5 mm långa.

Nanophyes marmoratus hittar man bara på fackelblomster, den är alltså monofag. Skalbaggen lägger sina ägg i blomknopparna där larven utvecklas. För värdväxten blir följden att blommorna inte slår ut och att

fröproduktionen minskar.

Tachyerges salicis förekommer på diverse Salixarter där larverna minerar bladen så att de delvis ser vissna ut. Den här viveln har kraftiga baklår och hoppar bra vilket gör det lite knepigt att fånga in den.

Text och bild Staffan Kihl

Fotografering av fjädermott - ett tips

Att fotografera fjädermott i fält är inte svårt men tyvärr visar de sällan upp något annat än framvingarna. Resultatet blir bättre om man fångar in dem och bedövar dem lätt. När bedövningen börjar ta visar de snabbt upp även bakvingarna och är lättare att fota. Om man

då och då skakar burken som man har dem i ser man lätt när de börjar veckla ut sig. Släpp ut dem efter fotograferingen så kvicknar de snabbt till igen!

Text och bild Staffan Kihl



Flockfiblefjädermott