


FYND av ISSUS MUSCAEIFORMIS i SÖRMLAND

Peter Wärmling

Denna spektakulära strit (Hemiptera) påträffades av förf. den 12 sept.1999 vid Hölö i Sörmland. En hona hävdades en solig varm sensommardag i eksly under en mycket grov hålek. Håleken står på ett öppet fält i kanten av ett västvänt berg, så biotopen är sannolikt värmegynnad. Enligt Bengt Ehnströms bok Faunavård i skogsbruket- den lägre faunan så är Issus muscaeiformis (Schrank.) en sällsynt och lokal art som i Sverige påträffats i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Västergötland, Bohuslän och Sörmland. Den är funnen i Danmark, Norge och förekommer i Mellaneuropa, Italien, Balkan och Sydryssland. Arten lever på levande lövträd, främst ek, i solexponerade sluttningar, skogsbryn etc. Arten är hotad genom sin bundenhet till ekbestånd och hör till Hotkategori 2.



Synonymt namn är Issus coleoptratus. Förf. föreslår namnet "Flugstrit" som ju är en tolkning/översättning av det nya namnet "muscaeiformis" hellre än "skalbaggsstrit" som har föreslagits. Men detta namn är ju en tolkning/översättning av "coleoptratus" som inte skall gälla längre. Eventuellt skulle djuret kunna heta "fetstrit" med tanke på dess bulliga form. Men detta skulle vara missvisande eftersom den har mera luft än fett under de nätådriga vingarna....

Vad gäller de svenska fynden så meddelar CC Coulianos att Skånefynden gjordes på Kullaberg av Ossiannilsson för drygt 50 år sedan, Ölandsfynden är från Halltorps Hage, Smålandsfyndet är från Ytterhult vid Västervik gjort av Gustav Rudbeck 1933 och det enda sörmlandsfyndet är från 1942 och gissa var? Jo, på etiketten står Hölö! Övriga landskapsnoteringar finns inga uppgifter om.